

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
کود حیوانی: 20-30 تن در هکتار پلت مرغی: 1-2 تن در هکتار	خاکی	پلت مرغی	کود حیوانی	
				مرحله رشد
250-300 کیلوگرم در هکتار			10-5-10	آماده سازی زمین

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
20 لیتر در هکتار	کود آبیاری		هیومیک اسید	
25-50 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	10-52-10	اوره فسفات	مرحله رشد
				شروع رشد رویشی

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	 <p>مرحله رشد</p> <p>پایان روزت (پایان توسعه برگه)</p>	
30 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	میکرو ریزمغذی		
میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	 <p>مرحله رشد</p> <p>رشد ساقه تا شروع غنچه دهی</p>
20 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری		20-20-20	
سولفات آمونیوم: 50 کیلوگرم در هکتار اوره: 25 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	اوره	سولفات آمونیوم	

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
30 لیتر در هکتار	کود آبیاری	اسید هیومیک	مرحله رشد
			گلدهی
میزان مصرف	نحوه مصرف	کود پیشنهادی	
20-30 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	15-5-30	مرحله رشد
			شکل گیری غلاف