

توضیحات	میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
	کود حیوانی: 10-20 تن در هکتار پلت مرغی: 1-2 تن در هکتار	خاکی	پلت مرغی	کود حیوانی	
به صورت اختلاط با کود حیوانی	300-400 کیلوگرم در هکتار	خاکی		10-5-10	قبل از کاشت (آماده سازی زمین)
توضیحات	میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
	20 لیتر در هکتار	کود آبیاری		اسید هیومیک	
حداقل 10 روز بعد از بیرون آمدن گیاه از خاک	30 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	10-52-10	اوره فسفات	سبز شدن و تشکیل برگ ها

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
20 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری		میکرو ریزمغذی	
20 لیتر در هکتار	کود آبیاری		اسید هیومیک	مرحله رشد
50 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری		نیترات کلسیم	
25 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	12-12-36	سولوپتاس	غده زایی

میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
1 لیتر در هزار لیتر آب	محلول پاشی		کود کلسیم	
15-5-30 به میزان 40-50 کیلوگرم در هکتار 12-12-36 به میزان 25 کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	12-12-36	15-5-30	مرحله رشد تورم و پر شدن غده ها

توضیحات	میزان مصرف	نحوه مصرف	کود جایگزین	کود پیشنهادی	
	1/5 لیتر در هزار لیتر آب	محلول پاشی		کود کلسیم	
زرد شدن اندام های هوایی	2 لیتر/کیلوگرم در هزار لیتر آب	محلول پاشی	کود پتاس بالا	سولوپتاس	مرحله رشد قبل از برداشت